

PREDIO "CAÑADA NIETO"

- Departamento:** Soriano
Paraje: Palo Solo
Ubicación: Ruta 12 Km. 43
Productor(es): Miguel y Alfredo Banchemo
Superficie: 1.384 hás.
Vinculación jurídica: Propiedad: 27% Arrendamiento: 60% Otras: 13%
Rubros (en orden de importancia relativa): Ganadería - Agricultura
Suelos de la región: El establecimiento es muy representativo de una amplia zona agrícola del Suroeste de Soriano y Noroeste de Colonia, donde predominan los Grupos de Suelos o de Productividad CONEAT 11.7, 11.8 y 11.2 con campos bajos asociados.
- Características generales:*
Relieve moderado y algo fuerte
Grados moderado y severo de erosión y degradación
Suelos profundos de fertilidad alta, asociados a suelos alcalinos (blanqueales) de baja fertilidad
Manejo general actual - agricultura convencional con escasos sistemas de conservación de suelos
- Uso del Suelo:** Cultivos y praderas en siembra directa
Capacidad de Uso:



CLASE	SUELOS	LIMITACIONES	AGRICULTURA CONVENCIONAL	SIEMBRA DIRECTA
B	Muy profundos Fertilidad Alta	Tierras bajas	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas de tiempo para laboreo, siembra y cosecha 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejores oportunidades para siembra y cosecha
C	Profundos Fertilidad Alta	Relieve Suelo degradado Riesgo de erosión	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematizar la chacra • Dejar entre 7-8% sin cultivar • Riesgo de erosión • Rotaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Control de erosión • Aumento del área cultivable • Rotaciones? • Recuperación del suelo
D	Profundos de fertilidad alta con blanqueales asociados	Relieve Erosión y degradación Riesgo de erosión Blanqueales	<ul style="list-style-type: none"> • Graves problemas por limitaciones anteriores 	<ul style="list-style-type: none"> • Control de erosión • Recuperación del suelo
E	Muy profundos Fertilidad Alta	Tierras bajas Mal drenaje	<ul style="list-style-type: none"> • No apta 	<ul style="list-style-type: none"> • Ocasionalmente posible • Cultivos o mejoras forrajeras