

Bagre negro



Orden: Siluriformes

Familia: Pimelodidae

Género y especie: *Rhamdia quelen* (Quoy & Gaimard, 1824)

Nombre común: Bagre negro, Bagre sapo, Bagre sudamericano, Jundiá, Southamerican Catfish.

Descripción: es un bagre integrante de la familia Pimelodidae y al género *Rhamdia* el cual tiene alrededor de 11 especies. Su cabeza es pequeña en relación a la longitud de su cuerpo, boca ancha con dientes diminutos en forma de sierra, presenta barbillas maxilares y mentonianas. En su aleta dorsal tiene una espina muy fuerte, en cambio la aleta caudal es pequeña. Tiene un cuerpo ancho y puede medir hasta 50 cm y pesar 5 kg. Aletas grisáceas. Cuerpo ancho y bajo, sin escamas, con cabeza deprimida, ojos pequeños y boca ancha de quijadas.

Color: coloración plomizo oliváceo hasta pardo negruzco en el dorso y flancos, vientre blanco.

Distribución: se encuentra ampliamente distribuido en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guayana, Guayana Francesa, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Extendiéndose por el Río Uruguay medio e inferior, Paraná medio e inferior, cuenca del Pilcomayo y en la Amazonía. Se le encuentra principalmente en lagunas y arroyos de estos países.

Hábitat y Biología: especie muy común en ríos y arroyos de poca corriente así como en lagunas, ya sea de fondo lodoso o firme, encontrándose en toda la columna de agua, fundamentalmente en el fondo y en las orillas debido a sus hábitos alimenticios. En estado natural las hembras ovígeras (hembras con huevos) se encuentran entre setiembre y diciembre, pudiendo desovar más de 100.000 huevos por kilo de peso, que luego son fecundados por el macho. No construyen nido. Preferentemente de hábitos nocturnos, teniendo poca visión y muy desarrollado el olfato.

Alimentación: es una especie omnívora (alimentación variada tanto animal como vegetal), pero con clara tendencia carnívora, alimentándose de peces pequeños, crustáceos y otros animales bentónicos.

Características para su uso en acuicultura: buena calidad de carne, resistencia a la manipulación y a las condiciones adversas del medio. Fácil adaptación a raciones, no presenta comportamiento agresivo. Es una especie que puede ser criada en cultivos de arroz así como en policultivo con otras especies. Puede ser cultivado en tajamares o jaulas a nivel extensivo o semi intensivo.

Importancia económica: especie conocida y apreciada en el mercado del interior del país. También posee un mercado regional, especialmente Argentina y Brasil.