



**Identificación del recurso** Clase: Chondrichthyes

Subclase: Elasmobranchii

Orden: Squatiniformes

Familia: Squatinidae

Especie: *Squatina guggenheim*

Nombre común: angelito


Nombre en inglés: angel shark

### **Características externas**

Cuerpo achatado dorso-ventralmente. Dorso marrón oscuro y faz ventral blanca. Ojos dorsales y espiráculos (más grandes que los ojos) ubicados por detrás. Boca terminal. Margen anterior de las pectorales cubre las cinco hendiduras branquiales. Con una línea de espinas en la línea medio dorsal, que en las hembras adultas se presentan como tubérculos redondeados romos. Dos aletas dorsales en la cola de tamaño pequeño. Talla máxima 85 cm

### **Distribución geográfica y Hábitat**

La especie es endémica del Atlántico sudoccidental. Se distribuye desde el sur de Brasil hasta los 43° S. A partir de los 34° S se encuentra presente desde la costa hasta los 150 m de profundidad. Es de hábitos bentónicos. Las hembras grávidas migran a aguas someras en primavera para parir



### **Reproducción**

La madurez sexual se inicia para ambos sexos cuando alcanzan entre 70 y 80 cm de longitud. Las hembras tienen sólo el ovario izquierdo funcional. El ciclo reproductivo dura 11 meses comprende dos períodos: los primeros 5 meses los embriones se desarrollan en el útero mediante lecitotrofia y los meses restantes la gestación es cloacal. Los embriones a término alcanzan los 28 cm de longitud total.

### **Alimentación**

Se alimenta fundamentalmente de peces (pescadilla, merluza, papamosca, pez palo, lenguados, anchoíta), crustáceos (camarón, langostino) y moluscos (calamar y calamarete).

### **Pesca**

Es capturado por la pesca artesanal y por la flota comercial costera dirigida a corvina y pescadilla y por la de altura dirigida a merluza. En el mercado interno se consume generalmente como "bacalao" criollo

**Categoría IUCN:** en peligro