

## ***Scutia buxifolia* Reissek**

**Nombre común:** Coronilla

**Hábito:** árbol de 3 a 12 metros de alto, siendo bajo pero corpulento. Corteza castaño oscura, rugosa, caduca en pequeñas placas o fajas cortas. Follaje perenne, verde oscuro, lustroso; ramas con fuertes espinas rectas y cónicas, perpendiculares al tallo y subopuestas, pero a veces inerme. Fuste corto y generalmente tortuoso. Copa globosa, bien desarrollada.



Hábito y detalle de la corteza caduca en placas.

Fuente: <http://floradeluruguay.blogspot.com.uy/>; <http://parquebatalladelaspiedras.canelones.gub.uy/images/Coronilla.jpg>

**Hojas:** simples, alternas, opuestas o subopuestas. Elípticas hasta ovado-lanceoladas, íntegras (rara vez dentadas), glabras, de ápice agudo, de 1,5 a 4 cm de largo por 1,5 a 3 cm de ancho; margen entero; base cuneada o redondeada, pecíolos cortos de 2 ms.



Hojas simples, alternas y espinas. Fuente: <http://floradeluruguay.blogspot.com.uy/>

**Flores:** en inflorescencias pequeñas de hasta 5 flores que se ubican en las axilas de las hojas de ramillas jóvenes, verdosas a verde-amarillentas muy poco llamativas, cortamente pediculadas. A veces flores solitarias. Las flores son hermafroditas, actinomorfas (simetría radial).



Detalle de flores en pequeñas inflorescencias

**Fruto:** drupa globosa, carnosa, de color violeta al madurar, de menos de 1 cm de diámetro. Contiene en su interior de 2 a 3 semillas.



Fruto drupa violáceo al madurar. Fuente: <http://floradeluruguay.blogspot.com.uy/>

**Fenología:** la floración se da en primavera setiembre-octubre y fructifica entre el final de la primavera y verano.

**Propagación:** se reproduce por semillas, que deben ser sembradas en la misma estación en la que maduraron.



Detalle de semillas

**Peso de 1000 semillas:** 13 - 18 gramos.

**Distribución:** Bolivia, Brasil austral, centro norte de Argentina y todo el Uruguay donde : crece en bosques serranos y ribereños de todo el país. Durante muchos años fue la fuente para elaboración de carbón, aspecto que llevó a diezmar nuestros montes de coronillas existentes en las serranías de la zona litoral, este y noreste.



Distribución de *Scutia buxifolia* en el país. Fuente: Brussa y Grela, 2007.